

Undersökning av korrelationen vinternedfall och infektionsgrad på våren.

Kupnummer	Nr. 11	Nr. 15	Nr. 24	Nr. 27	Nr. 4			
Vinternedfall	30	30	50	150	15			
11 12.00-18.00	5	23	9	9	0			
12 18.00	0	5	2	6	0			
13 17.00	0	7	7	1	0			
14 17.00	1	7	4	1	0			
15 17.00	1	13	9	1	0			
16 17.00	0	8	13	3	0			
17 17.00	0	23	8	7	0			

Nedfall uppsamlat på varroabråde 390 kvcm. 6ramar ca 990 kvcm. Resultaten ska alltså multipliceras med faktor 2,5 för samhälle 24 och 27 och med faktor 5 för övriga.

Behandling med 1 remsa Apistan inledd 150411 k 12.00. Första nedfallet mätt efter 6 timmar. Antar att detta är lika med de kvalster som fanns på bina.

Därefter har nedfallet räknats varje dygn. Antar att detta nedfall motsvarar nya kvalster som kommer ut med nyfödda bin. I samhälle 15 den 15e var fyra kvalster bleka, oparade!

Anmärkningsvärt med samhälle Nr.4 som inte har några kvalster alls i nedfallet. Samhället fyller 12 Dadantramar. Den 15e fick 4an ytterligare en remsa men efter ett dygn fortfarande inget nedfall!

